Insetticidi e acaricidi



Azamet 10 EC

Insetticida multinsetto uso professionale

Caratteristiche

Azamet 10 EC è un insetticida concentrato emulsionabile per applicazioni spray o per nebulizzazione, a base di azametifos, per trattamenti residuali contro insetti striscianti e volanti come cimici dei letti, scarafaggi, formiche, mosche, zanzare e vespe.
Dalla famiglia degli organofosforici un insetticida multinsetto con azione abbattente e persistente. Una soluzione concreta ai problemi di resistenza ai piretroidi.
La totale mortalità si osserva entro pochi minuti dall'applicazione sulle zanzare ed entro 24 ore dal trattamento per scarafaggi, cimici dei letti, mosche, zanzare e nidi di vespe e formiche.
Applicato come spray, il prodotto mantiene la sua efficacia residuale per 6 settimane.

Composizione

Azametifos puro: g 10 (100 g/L)

PZ/cartone

FLACONE GIUSTA-DOSE 1 L × 6 pz

Dosi e modalità d'uso

Per trattare una superficie di 100 m²
Trattamento su superfici non porose: diluire 100 mL di prodotto, in 5 litri d'acqua Trattamento su superfici porose: diluire 200 mL di prodotto in 5 litri d'acqua.
Metodo raccomandato per l'applicazione su scarafaggi, cimici dei letti, formiche e zanzare Scarafaggi: spruzzare il prodotto direttamente nelle crepe o nelle fessure. Cimici dei letti: Dopo aver rimosso indumenti e/o lenzuola, spruzzare il prodotto in modo omogeneo l'interno e l'esterno dei mobili infestati (armadi, guardaroba, cassettiere). Estrarre i cassetti, ove presenti, ed applicare sul fondo e sui lati dei cassetti. Lavare accuratamente gli indumenti che erano conservati al loro interno. Spruzzare il prodotto sotto e intorno alla struttura letto, sotto al materasso, dietro la testiera. Non trattare la biancheria da letto con questo prodotto. Zanzare: spruzzare intorno alle fonti di illuminazione, intorno ai letti e sulle tende. Formiche: applicare all'entrata del nido e più ampiamente intorno alle entrate. Per un nido tipico, spruzzare uniformemente in un'area di circa 1 m² intorno al nido (circa 50 mL di prodotto/nido) utilizzando il dosaggio di superficie porosa. Per ottenere i migliori risultati nei trattamenti all'interno, lasciare gli ambienti chiusi per 4-6 ore, quindi ventilare abbondantemente prima di rioccupare le stanze. Aspirare l'intera area trattata per raccogliere gli insetti morti.

Campi d'impiego

Ambienti interni

Simbologia di pericolo: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09 Reg. PMC: 21314 - AZAMET 10 EC Titolare della registrazione: Armosa Tech S.A. - ZI de Hermalle-sous-Huy. - Rue des Tuiliers, 1 B 4480 Engis - Belgio

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 19 novembre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.