Monitoraggio



Cimirex Trap

Trappola per il monitoraggio della cimice asiatica

Caratteristiche

Trappola progettata per il monitoraggio delle popolazioni di cimice asiatica (*Halyomorpha halys*). La trappola utilizza feromoni specifici di aggregazione per le forme giovanili e feromoni sessuali per gli adulti, permettendo un monitoraggio efficace dei diversi stadi di sviluppo. La struttura favorisce l'ingresso degli insetti e ne limita la fuoriuscita, garantendo una lettura affidabile dell'andamento dell'infestazione.

PZ/cartone

- TRAPPOLA × 4 pz
- FEROMONE × 10 pz

Dosi e modalità d'uso

Installare da metà aprile a fine settembre, in funzione del clima locale. Posizionare la trappola a metà altezza della chioma nei frutteti oppure a circa 50 cm dal suolo nelle colture orticole. Impiegare 2–3 trappole per ettaro in frutteto, mentre in orti e giardini 1 trappola ogni 10 m, alternandola tra una riga e la successiva; in orticoltura intensiva 1 trappola ogni 1.000 m², fino ad un massimo di 1 ogni 100 m² in caso di presenza elevata di cimici. Sostituire gli attrattivi ogni 7–9 settimane in funzione delle condizioni ambientali.

Specifiche

Dimensione: 40 × 8 cm

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22,
35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy

Aggiornamento del 30 ottobre 2026

Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.